



1

Een goede behandeling begint met de juiste diagnose

- Bepaal de ziekteverwekker. Er zijn verschillende soorten; virussen, bacteriën en parasieten
- Stem behandeling op de ziekteverwekker af
 - Antibiotica werken alleen tegen bacteriën
 - Niet alle antibiotica werken tegen alle bacteriën. Laat een gevoeligheidsbepaling doen (van belang voor toekomstige behandelingen)
- Check de andere risicofactoren, zoals klimaat, huisvesting en voeding

Behandel alleen als dat nodig is!



3

Wijk niet af van de aanbevolen dosering

- Bij te lage dosering: kans op onvoldoende resultaat en resistentievorming
- Bij te hoge dosering: mogelijk gevaar voor het dier en/of een langere wachttijd
- Bij voer- of drinkwatermedicatie: doseer per kg lichaamsgewicht



5

Maak de behandeling altijd af, ook al lijkt het dier beter

- Te kort behandelen kan leiden tot terugkeer van het ziektebeeld en/of resistentieontwikkeling
- Bij onvoldoende resultaat: overleg met uw dierenarts



7

Denk aan uw veiligheid

- Voorkom zelfinjectie
- Voorkom inslikken en/of inademen, gebruik beschermingsmiddelen
- Was uw handen na toediening of draag handschoenen



9

Wat moet u noteren?

- Naam diergeneesmiddel, REG NL nummer en batchnummer
- Datum toediening
- Gebruikte hoeveelheid
- Naam en nummer dier
- Bij koppelinfectie: afdeling en aantal behandelde dieren
- Einde wachttijd na laatste toediening
- Toediener
- Leverancier van het diergeneesmiddel



11

Bewaaradviezen diergeneesmiddelen

- Kijk op de verpakking en/of bijsluiter
- Noteer de aanprikkdatum op de fles
- Beperk de voorraad
- Bewaar buiten het bereik van kinderen

Verkeerd bewaren kan de werkzaamheid en de diergezondheid nadelig beïnvloeden



2

Gebruik alleen geregistreerde diergeneesmiddelen

- Controleer het REGNL nummer
- Lees en bewaar de bijsluiter
- Houdt u aan het bedrijfsbehandelplan of overleg met uw dierenarts over het in te zetten middel



4

Houdt u aan de aanbevolen toedieningswijze

Injectie

- Let op de juiste injectieplaats: IM (Intramusculair) = in de spier, SC (Subcutaan) = onder de huid
- Zoek een schoon stuk huid en werk hygiënisch
- Gebruik wegwerpmateriaal of schone spuiten
- Gebruik scherpe naalden
- Botte naalden veroorzaken meer pijn en veel weefselschade

In het uier

- Reinig en desinfecteer de speenpunt goed
- Gebruik de korte punt van de injector
- Oraal (via voer of drinkwater)
 - Neem de juiste dosering (per kg lichaamsgewicht)
 - Zorg in voer voor goede menging
 - Zorg in drinkwater voor volledige oplossing
- Topicaal (op de huid)
 - Voorkom afdruppen naar het uier



6

Gebruik alleen combinaties van diergeneesmiddelen als uw dierenarts dit adviseert

- Combinaties kunnen:
 - elkaars werking opheffen of juist versterken
 - schadelijk zijn
 - elkaars wachttijd beïnvloeden



8

Voorkom overschrijding van de residunormen

- Houdt u aan de bijsluiter en de instructie van de dierenarts
- Maak behandelde dieren goed herkenbaar (pootbanden, elektronisch, lijst in melkstal) en melk behandelde koeien als laatste
- Laat de melk onderzoeken bij twijfel
- Let op: ook andere diergeneesmiddelen, zoals wormmiddelen en pijnstillers kunnen residuen veroorzaken!



10

Evalueer behandelingen regelmatig met uw dierenarts

- Dit is van belang voor toekomstige behandelingen
- Meld bijwerkingen aan uw dierenarts

Illustratie: Henk Vrieselaar

Fidin



Dit is een gezamenlijke uitgave van de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneesmiddelen ter bevordering van verantwoord diergeneesmiddelengebruik.